

VAS_SPA

Record ID _____

Evaluación de la Adherencia

Entendemos que a la mayoría de la gente le resulta difícil acordarse siempre de tomar su medicación. Por ejemplo, algunas personas se olvidan de llevar su medicación cuando salen de casa o cuando viajan; otros se saltan dosis para evitar los efectos secundarios o simplemente sienten que ese día no pueden tomar la medicación. Recuerde que esta información es confidencial y no será revelada ni a su médico ni a nadie del establecimiento de salud.

En las últimas 4 semanas, ¿cómo calificaría su capacidad para tomar la medicación como se le indicó? (haga una cruz en la respuesta correcta). En la visita basal, si el paciente no está tomando medicamentos marque como era en las últimas 4 semanas antes de abandonar el tratamiento.


- Muy Mala
- Mala
- Regular
- Buena
- Muy Buena
- Excelente

Escala Visual Análoga para la toma de medicamentos (VAS)

Instrucciones: Marque con una "X" el punto que mejor describe la proporción de antirretrovirales que ha tomado en las últimas 4 semanas. Cero significa que no ha tomado nada, 50 sería la mitad de lo que debía tomar, 100 significa que ha tomado todas las dosis de antirretrovirales en las últimas 4 semanas

A. Antirretroviral 1

0 50 100

*(Place a mark on the scale above)*

B. Antirretroviral 2

0 50 100

*(Place a mark on the scale above)*

C. Antirretroviral 3

0 50 100

*(Place a mark on the scale above)*